

ལེབ་སྤྱད་པ། མཆིན་པའི་ནད་གསོ་བ།

ГЛАВА 36 ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ПЕЧЕНИ

དེ་ནས་ཡང་དང་སྤྱོད་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསུངས་སོ། །ཀྱེ་དང་སྤྱོད་ཆེན་པོ་ཉན་ཅིག།

Затем снова мудрец-риши Ригпей Еше (*rig pa'i ye shes*) молвил: «О, великий мудрец-риши, слушай же!

བཅུན་མོ་ལྟ་བུ་མཆིན་པའི་གསོ་ཐབས་ལ། རྒྱ་དང་དབྱེ་བ་རྟགས་དང་བཙས་ཐབས་བཞི།

В [главе о] методах лечения болезней печени, уподобляемых царице, есть четыре [темы]: причины, классификация, симптомы и методы лечения.

རྒྱ་ནི་ཆ་སྒྲུབ་ཟས་དང་དཀ་ཤུལ་སྒྱེད།

1 Причины: [болезням печени] способствуют жгучая, кислая пища, а также физическое напряжение.

དབྱེ་བ་ལེབ་རྒྱ་རྒྱས་དང་ལྡེམ་བུ་དང་། རྟག་ཐབས་རྒྱ་ཤོར་རྒྱ་བུ་འོར་ལྷང་དང་། ཁ་ལུང་གཞུང་རེངས་མཆིན་གྱིས་ནག་པོ་དང་། མཆིན་ནད་ལྷུ་སྒྲུབ་མཆིན་དྲི་དཀར་ནག་དང་། གཞན་མཆིན་ཅ་བྱེར་མཆིན་རྒྱུ་མཆིན་རྒྱད་དང་། རྩོད་གྲང་སྒྲུབ་གྲང་སྒྲོས་བཙེ་བ་རྒྱུ་དོ།

2 Классификация. Их 18: увеличение [печени] — лебгенгье (*le brgan rgyas*), дембу (*Idem bu*), интоксикация дугтхаб (*dug thabs*), чхушор (*chu shor*), кюнбу (*rkun bu*), орлхунг (*'or lhung*), выплеск кхалуд (*kha lud*), жунгрэнг (*gzhung rengs*), чхиндрум

нагпо (*mchin grum nag po*), болезнь печени халкем (*hal skems*) , «белый» чхиндри карпо (*mchin 'dri dkar po*), «чёрный» чхиндри нагпо (*mchin 'dri nag po*), нечхин царджер (*gnad mchin rtsar byer*) — болезнь, рассеявшаяся в сосудах печени, лунг печени (*mchin rlung*), чхингуд (*mchin rgud*), лендранг (*rlan grang*), ланг-гур (*glang dgur*), дрангбё (*grang sbos*) – холодное вздутие.

དེ་རྟགས་མཆིན་ནད་ལེབ་ཀླན་རྒྱས་པ་དེ། མཆིན་སྤྱང་རྩིབ་ཐུང་གཡས་གཡོན་སྤྱོད་ཞིང་ན། ལྷུས་དང་མཆོགས་མ་སྤྱི་ཞིང་རོ་
སྤྱོད་གཟེར། སྤྱང་བཏོན་དིབ་སྒྲུལ་འོག་བརྒྱག་འབྲུགས་སྒྲུལ་བྱེད། རྩོག་ཕུར་འདུག་ན་ཐུར་ལ་འཐེན་པ་འདྲ། དཔ་སེར་མཁལ་
ཤིང་མི་བདེ་སྦྱིད་པ་འཁུམས།

3.1.1 Их симптомы. При увеличении [печени] — лебгенгье (*le brgan rgyas*) — она выбухает из подреберья слева и справа и болит, тяжесть в теле и темени, сильные боли в верхней части тела; когда он поднимает [больную сторону] вверх — возникает чувство, что что-то проваливается, когда помещает её вниз — чувство подпирания, когда садится на корточки — как будто тянут вниз, кожа желтеет, дискомфорт в почках и пояснице, вялость.

མཆིན་ནད་ཐེམ་བུ་ན་བ་མི་ཚར་བར། གཉིད་མེད་ཁོང་སྒྲུལ་ལྷུས་སྤྱི་ཟས་མི་འདོད། ཁྲག་འཕྲོས་ཤ་དང་རུས་པ་ཁད་ཀྱིས་
སྐྱམ།

3.1.2 При болезни печени дембу (*Idem bu*) — болей не ощущается, сна нет, вялость, тяжесть в теле, есть не хочется, кровь «уходит», постепенно усыхают мышцы и кости.

དུག་ཐབས་མིག་དམར་གདོང་ཕྱོ་རྩིབ་སྤྱང་བྱུག ཁོ་མཆིན་གང་སྒྲུལ་འཇུ་དཀའ་ཕྱོས་ཆོན། བྱུན་སྒྲུལ་བོལ་གཡོ་ཐུར་གོང་
མཐིལ་བཞི་སེར། གཞུག་དུ་མཆིན་པ་རུལ་ནས་དུད་ཁུར་ལ།

3.1.3 При интоксикации дугтахб (*dug thabs*) — глаза краснеют, лицо сереет, колет в подреберье, чувство переполненности желудка и печени, болит от употребления трудноперевариваемой пищи, кал сохнет, отекают лодыжки, желтеют виски, ладони и подошвы, в конце, печень разлагается и выходит [в виде нечистот] цвета сажи.

མུ་ཤོར་ཁོང་སྒོ་རོ་སྟོང་བརྩིས་ན་པན། སྒྲལ་རེངས་མཆེན་པ་འཕྱོངས་ཤིང་གཡལ་མི་ཐོན། ཤོ་མཆེན་སྟོང་སྟམ་དྲོས་དྲགས་མགོ་བོ་ན། །

3.1.4 При чхуцор (*chu shor*) — вздувается живот, но при надавливании на грудь возникает чувство облегчения, позвоночник тугоподвижен, печень тянет, трудно зевать, желудок и печень кажутся пустыми, от перегревания болит голова.

རྒྱུ་བྱ་རྒྱུ་པ་གང་ལ་རོ་སྟོང་གཟེར། མིག་གིས་ཡས་ཐུབས་མི་ཐེག་ཉམ་ཆུང་སྟ། སྟོང་གང་དཔུང་མགོ་གཟེར་ལ་སྒྲིཙ་རེངས། ཁ་ཟས་ཐོས་ན་བག་རེ་པན་སྟམ་བྱེད། །

3.1.5 При кюнбу (*rkun bu*) — ноги холодные, колет в груди, верхние веки не поднимаются, слабость, верх спины распирает, от чего болят плечи и голова, деревенеют жилы на шее, во время еды возникает некоторое чувство облегчения.

འོར་ལྷུང་གཉིས་ལས་མཆེན་ཁག་རྒྱུ་པར་ལྷུང་། རྒྱུ་པ་འཁོར་ཞིང་འགྲལ་ན་ཟུག་ཆེ་གཟེར། རྒྱུ་པར་ལྷུང་ན་དཔྱི་སྒྲིཙ་སྟམ་ཁོལ་བྱེད། རྒྱུ་པ་ཆ་ལ་ཆུ་རྒྱས་ན་བར་འོང་། །

3.1.6 Орлхунг (*'or lhung*) бывает двояким. Когда печёночная кровь опускается в поясницу, в ней появляются опоясывающие боли, которые усиливаются при движении. А когда она опускается в ноги — бёдра немеют, сохнут на некоторых участках, в пояснице появляется жжение и боли в связках и сухожилиях.

ཁ་ལྷུང་སྟོང་པོ་བར་ལྷུང་པ་གཉིས། སྟོར་ལྷུང་སྟོང་རྩིངས་མིག་དམར་མཆན་འོག་གཟེར། ཁག་རྩ་ལུ་ཞིང་སྐབས་སུ་ནག་ཁག་འཇོག ཤོ་བར་ལྷུང་ན་བསྐྱམས་ཤིང་གཟེར་ནས་ན། དགྲེ་དགྲེ་མི་ཤེས་ཆ་ཙོག་སྒྲེག་པ་འོང་། ལྷུང་དུ་བ་ཆེ་ལ་གསུམ་པ་སྟམ་མི་མཛོན། །

3.1.7 Выплеск кхалуд (*kha lud*) бывает двух [видов]: лёгочный и желудочный. При лёгочном — распирает грудь, краснеют глаза, сильные боли в подмышках, кашель с кровью, а временами выделяются гной и кровь. При желудочном кхалуд (*kha lud*) — будет [чувство] сдавливания и сильные боли, [больной] не может согнуться и

разогнуться, появляются жжение, отрыжка, при сильных приступах живот становится «не заметен взгляду».

གཞུང་རེངས་ཀླང་ལག་རེངས་ལ་སྒྱུ་ཆོགས་ན། དགྲེ་དགུ་མི་ཤེས་སྟོང་གཟེར་ལྷག་པར་དགྲེ།

3.1.8 При жунгрэнг (*gzhung rengs*) — тугоподвижны руки и ноги, болят крупные суставы, не согнуться, не разогнуться, в верхней части тела сильные боли, затылок выгнут.

མཆིན་གུམ་ནག་པོ་ལུས་ཀྱན་བརྒྱུངས་སྒྱུ་བྱེད། ཀླང་བཤལ་འགྲལ་ན་མི་བཟོད་སྒྱུར་པོར་འགོ།

3.1.9 При чхиндрум нагпо (*mchin grum nag po*) — все тело ломит как от побоев, ноги не слушаются, при движении — нестерпимые боли, [больной] сутулится при ходьбе.

ཉལ་སྒྲེམས་ལུས་པོ་བའ་འདར་གཞོགས་གཡས་མྱེ། མིག་མདངས་རྒྱུང་ཁིང་འཕྱར་ལ་སྒྲོམ་དད་ཆེ།

3.1.10 При халкем (*hal skems*) — тело зудит, дрожит, в правом боку тяжесть, глаза тускнеют и косят, сильная жажда.

མཆིན་ངྷི་དཀར་པོ་ལྷན་སྒྲུ་གཡས་གཡོན་ན། ཀའི་ཆེ་ཁ་སྒྲུ་ཕྱི་ལོགས་གཟེར་ནས་ན།

3.1.11 При чхиндри карпо (*mchin 'dri dkar po*) — боли справа и слева от мечевидного отростка, сильная сонливость, сохнет во рту, сильные боли в подреберье.

མཆིན་ངྷི་ནག་པོ་སྒོག་ཅ་སྒྲིང་མི་བདེ། ཁོང་པ་སྟོང་སྒྲོམ་སྒྲུ་ལྷན་འདྲིལ་ནས་ན།

3.1.12 При чхиндри нагпо (*mchin 'dri nag po*) — будут дискомфорт в сердце и канале жизни согца (*srog rtsa*), пустое вздутие, сверлящие боли в области мечевидного отростка.

གནད་མཆིན་ཅ་བྱེར་སྟོད་གཟེར་ཐལ་གོང་ན། །སྟོད་གང་པོ་མཆིན་མི་བདེ་ཅེ་ཆུང་རེངས། །ཁྲོ་བྱང་མཆིན་པ་འཕྱངས་ལ་
བཟོད་ཐབས་མེད། །བྱད་སྒྱུག་སྒྲ་ཁྲག་འཇག་ཅིང་ཅི་ཟོས་གཞོད། །

3.1.13 При нечхин царджер (*gnad mchin rtsar byer*) — сильные боли в верхней части тела и в плечах, [чувство] наполненности груди, дискомфорт в печени и желудке, затвердевает сосуд *rtse chung*, при кашле кажется, что печень отвисает и невыносимо болит, лицо багровое, носовые кровотечения, вредит, что бы ни съел.

མཆིན་རྒྱང་གཡལ་བྱང་རྩེས་ལ་མཆི་མ་འཇག། །པོ་མཆིན་འདྲེས་སྒྲམ་བྱེད་ཅིང་ན་ལ་འཕྱངས། །དགོང་དང་ཐོ་རངས་ན་ཞིང་
གང་ན་སྒྱིག། །

3.2.1 При лунг печени (*mchin lung*) — после приступа зевоты из глаз текут слёзы, тянущие боли, словно печень слиплась с желудком, болит вечером и на рассвете, а от холода икота.

མཆིན་རྒྱང་ཟས་ཟོས་རྩེས་ལ་མཆིན་པ་ན། །ཉམ་ཆུང་ཆུ་དྲོན་སྒྱུག་ལ་གཡལ་མི་བྱིན། །

3.2.2 При чхингуд (*mchin rgud*) — боли в печени после еды, слабость, отрыжка жгучей жидкостью, зевать не получается.

མཆིན་པ་ལྷན་གང་ཕུས་མོ་གང་ཞིང་བ། །སྟོད་གང་སྟོ་སྒྲམ་ལུ་ཞིང་དགྲེ་དགྲུ་དཀའ། །

3.2.3 При лендранг (*rlan grang*) — «сырой и холодной» печени — стынут и зудят колени, распирает грудь, сухой кашель, трудно сгибаться и разгибаться.

སྒང་དགྲུར་ལུས་སྒངས་བྱད་སྟོས་ལྗེ་མཆུ་སྒྱ། །མགོ་འཁོར་སྒྱ་སྒྲིན་བ་ལ་སྒྲ་བྱ་འབྱང་། །

3.2.4 При ланг-гур (*glang dgur*) — отекает тело, опухает лицо, язык и губы белёдые, голова кружится, зуд в волосах и бровях, язвы в носу.

གང་སྤྱོད་ཁོང་པ་གང་ལ་བྱད་ཤ་སྤྱོད།

3.2.5 При дрангбё (*grang sbos*) — внутри холод, опухают мышцы и лицо.

བཅོས་ཐབས་མཆིན་ནད་ལེབ་ཀྱན་རྒྱས་པ་ལ། གི་མི་སྦྱ་རུ་ར་ཡི་ཐང་བཏང་ལ། ར་ས་ཡ་ན་(དོང་ག་དུར་བྱིད་ཉོང་ལེན་ཚོན་
བུ་ལྷུ་ཅ་ཐར་རུ་རེ་ལྷག་སྦྱར་པ་ཨ་རུ་)འི་བཤལ་བཏང་རུ་ཐུང་གཏར། མཁྱིས་ཆེན་(དོམ་མཁྱིས་བྲག་ལྷན་ཨ་རུ་མར་གསར་)
སྦྱོར་བ་རྒྱན་འབྲུམ་ཐང་གིས་དབུལ། ཁ་བ་ཞེན་ཆེ་ག་བུར་བདུན་པ་སྦྱར། ཉལ་བའི་ཐུས་སྦྱང་ཁ་བས་བསིལ་དུ་བསྟེན། །

4.1.1 Методы лечения. При болезни печени лебгенгье (*le brgan rgyas*) дают отвар из *gi wang* и *skyu ra ra*, назначают прослабление «*ra sa ya na*» {из *dong ga, dur byid, hong len, khron bu, lcum rtsa, thar nu, re lcag, skyer pa, a ru ra*} и делают кровопускание из *ru thung*. Готовят состав *mkhris chen sbyor ba* {из *dom mkhris, brag zhun, a ru ra* со свежим сливочным маслом}, запивать отваром *rgun 'brum*. Если преобладает въевшийся жар, готовят состав *ga bur* 7. [Больному следует] спать на низкой подушке, употреблять охлаждающие продукты.

མཆིན་ནད་ཐེམ་བུ་ཨ་རུ་(བར་སྦྱར་སྟེ་ཉེས་ཉིག་ཏ་བོང་ང་ཉོང་ལེན་ལྷུ་ཅ་དོང་ག་དུར་བྱིད་སྦྱར་བ་)འི་ཐང་ཐུས་བྲ། གཡུ་
རྟིང་ཐུར་ནིས་(ག་བུར་ལི་ཤི་ཅན་དན་དོམ་མཁྱིས་སྦྱ་ཅི་རྒྱན་འབྲུམ་གསེར་མེ)བྲག་ལྷན་(གུར་ཀུམ་བ་ལེ་ཨ་རུ་ཤི་ཡཱ་ཁྱུ་)ཐུ་པ་
སྦྱར། །

4.1.2 При болезни печени дембу (*Idem bu*) следует промывать организм отваром из *a ru* {*ba ru, skyu ru, sle tres, tig ta, bong nga, hong len, lcum rtsa, dong ga, dur byid*}. Смешивают порошок *g.yu rnying cur nis* {из *g.yu rnying, ga bur, li shi, tsan dan, dom mkhris, gla rtsi, rgun 'brum, gser me*} и *brag zhun* - 5 {*c gur kum, ba le, a ru, pri yangku*}.

དུག་ཐབས་སྦྱང་བུས་གསེར་ཐུང་(བཟུས་ཁུར་བུལ་ཏོག་བཏབ་པའི་)སྦྱགས་ཀྱིས་བྲང་། གཡུ་རྟིང་(གུར་ཀུམ་ལི་ཤི་)ལྷན་པེ་
སར་གསུམ་)བདུན་པ་སྟེ་བའི་(མེ་ཏོག་ལྷུ་ཅ་ཉིག་ལེང་ཐེང་ཤིང་ཆའི་)ཐང་གིས་དབུལ། རྩེས་གཙོད་གི་མི་(ཅན་དན་དཀར་
དམར་རེ་རལ་སྟོན་བུ་མཆལ་བཅད་འབྱོར་གཉིས་དང་)བརྒྱད་པ་བ་འོས་དེད། །

4.1.3 При интоксикации дугтахб (*dug thabs*) следует назначить голодание и выводить [болезнь] рвотным из *gser phud* {в виде сгущённого отвара с

добавлением *bul tog*}. Назначают *g.yu rnying-7* {из *g.yu rnying, gur kum, li shi, utpal, ge sar gsum*}, запивать отваром из цветков *snyi ba* {*sum cu tig, seng ldeng, shing tsha*}. Пресекают последствия составом *gi waM -8* {из *gi waM, tsan dan dkar, tsan dan dmar, re ral, sngon bu, mtshal, bcad 'byor gnyis* («два лекарства, соединяющих разорванное»)), направляемым коровьим молоком.

མཆིན་པ་ཚུ་ཤོར་ར་གསུམ་བ་ལའི་ཐང་། རུ་ཐུང་ཅེ་ཚུང་མཆིན་མཁྲིས་འདོམ་ཚ་གཏར། ཁྲོ་དང་བཟློངས་ན་ཚུ་གང་ལྡེ་གུ་
ཐུར། རྩིས་ལ་ཆོགས་པ་ལྷ་དང་དགུ་བ་བཞེག།

4.1.4 При чхушор (*chu shor*) печени дают отвар *ra gsum* («трёх *ra*») и *ba le* и делают кровопускание из [сосудов] *ru thung, rtse chung, mchin mkhris 'dom rtsa*. Если задеты лёгкие, готовят пасту-дегу из *cu gang*, а затем прижигают точки пятого и девятого позвонков.

མཆིན་ནད་རྒྱན་བྱ་ཨ་ལོ་གཉིས་ལ་གཏར། བ་ལེ་ཀ་(ཁྲོ་དྲིས་ཨ་རུ་རྒྱན་འབྲུམ་བོང་ད་ཉོང་ལེན་ཉིག་ཏ་སྒྲ་སྒྲང་དུག་ཉུང་གི་
ལྷ་དྲར་བྱིད་ཁྲོན་བྱ་)ཡི་བཤལ་བཏང་ཐན་བྱ་གཏར།།

4.1.5 При болезни печени кюнбу (*rkun bu*) — вскрывают оба сосуда *a so*, назначают слабительное из *ba le ka, {sle tres, a ru, rgun 'brum, bong nga, hong len, tig ta, gla sgang, dug mo nyung, kyi lce, dur byid, khron bu}*, выпускают кровь из мелких сосудов.

མཆིན་པ་འོར་དུ་སྒྲུང་བ་གཉིས་ཀ་ལ། འབྲུམ་བྱ་གསུམ་གྱི་(དུར་བྱིད་ཉོང་ལེན་ཁྲོན་བྱ་)བཤལ་བཏང་བྱིན་ལོང་
གཏར། དམར་གསུམ་བྱེ་མར་དར་ཡ་ཀན་(མི་དོམ་མཁྲིས་བྲག་ལྷན་གྱི་)ཐང་བཏང་།།

4.1.6 При обоих видах орлхунг (*'or lhung*) печени назначают слабительное из трёх плодов {*'bras bu gsum, dur byid, hong len, khron bu*}, вскрывают сосуды *byin [gzhug]* и *long [rtsa]*. Дают порошок трёх красных (*dmar po gsum*) с отваром *dar ya kan {mi mkhris, dom mkhris и brag zhun }*.

མཆིན་ཁག་སྒོ་ལ་ལུང་ན་(བ་ལེ་ཀ་ཨ་ཏུ་སྒྱུ་ཏུ་ལུས་ཅ་དུར་བྱིད་དོང་ག་)ཐང་ཁུས་བྲ། །སྒོ་ཅ་ཏུ་ཐུང་གཏར་ཞིང་བསིལ་སྒྲན་
བཏང་། །པོ་བར་ལུང་ན་ཏུ་ཐུང་འདོམ་ཅ་གཏར། །ར་གསུམ་(དུར་བྱིད་དོང་ལེན་གྱི་)བཤལ་དང་བ་ལེ་ཀ་(སྒྲ་སྒྲང་རྒྱན་འབྲུམ་
དོང་ལེན་ཨ་མྱི་པ་)ཐང་བཏང་།།

4.1.7 При выбросе печёночной крови в лёгкие следует промывать организм отваром из {*ba le ka, a ru, skyu ru, lcum rtsa, dur byid, dong ga*}, делать кровопускание из лёгочных сосудов и *ru thung*, назначать охлаждающие лекарства. При выбросе в желудок вскрывают *ru thung* и [*mchin mkhris*] *'dom rtsa*, назначают слабительное из *ra gsum* (трех «*ra*»), {*dur byid, hong len*} и отвар из *ba le ka, {gla sgang, rgun 'brum, hong len, a bhi Sha*}.

མཆིན་པ་གཞུང་རེངས་དུར་ལུགས་ཐང་དུ་བཏང་། །ཏུ་ཐུང་དུག་འགོ་པོ་གཏུང་གཏར་བར་བྲ། །བྱ་བུན་སྒྲང་སྒྲུམ་དུགས་ཀྱིས་
གཞུང་ཤལ་བདུག་བ་ལེ་ཀ་ཐང་བྲག་ལྷན་རྒྱར་ནིས་བཏང་།།

4.1.8 При жунгрэнг (*gzhung rengs*) печени следует назначать в виде отвара *dur lcags*, вскрывать сосуды *ru thung, drug 'go, pho gdung*, ставить компресс из мышинового помёта и сухой барды вдоль позвоночника, назначать отвар *ba le ka* и *brag zhun cur nis*.

མཆིན་གྲུམ་ནག་པོ་འབྲས་བྲ་གསུམ་ཐང་བཏང་། །རྩལ་དབྱུང་ཅེ་ཅུང་གཏར་ཞིང་ཐོན་བུས་(ཨ་ཏུ་ཟངས་ཅི་རྒྱན་འབྲུམ་གྱི་)
སྒྱུང་། །མར་གསར་སོ་མ་ར་ཇ་(བསིལ་གསུམ་ཨ་ཏུ་འདམ་བྲ་ཤིང་མངར་ལུགས་བྱེ་སྒྲང་དང་སྒྱར་བ་)འི་ཐེ་གུ་བཏང་། །རྩེས་ལ་
ཤ་སྒྲུབས་ཆོགས་དམིགས་གར་བབས་བསྟེག།

4.1.9 При чхиндрум нагпо (*mchin grum nag po*), назначая отвар трёх плодов (*'bras bu gsum thang*), вытягивают пот, выпускают кровь из *rtse chung*, вычищают составом из *sngon bu, {a ru, zangs rtsi, rgun 'brum}*. Дают пасту-дегу на свежем сливочном масле из *sro ma ra dza, {bsil gsum* (три охлаждающих), *a ru, 'dam bu, shing mngar, lcags phye* и мёда}. а затем прижигают места попадания [болезни] в мышечных складках и на суставах.

མཆིན་ནད་ཏལ་སྒྲེམ་ཨ་བི་པ་(པར་བ་ཏ་གྱི་ཕྱེ་)ཡི་ཐང་། །ཐོན་བུའི་བཤལ་བཏང་ཏུ་ཐུང་ཕན་བྲ་གཏར། །ལུམས་རྩེས་སྒྲན་
མར་སྒྱར་ལ་དགུ་པ་བསྟེག།

4.1.10 При болезни печени халкем (*hal skems*) дают отвар *a bhi Sha*, {*par pa ta, kyi lce*}. слабительное из *sngon bu*, пускают кровь из *ru thung* и мелких сосудов. После ванны готовят лечебное масло и прижигают точку девятого позвонка.

མཆིན་རྩི་དཀར་པོ་མཆིན་མཁྲིས་འདྲེན་ཅ་གཏར། །བ་ལེ་ཀ་དང་གྱི་ལྷེའི་གང་ཐང་བཏང་། །གུར་གུམ་(ལི་ཤི་སུག་སྒྲེལ་ཀ་ཀོ་
ལ་ད་བྱིད་པར་བ་ཏ་སྤང་སྒྲོས་བྱ་མོ་བ་སྤང་སྒྲེ་)བརྒྱད་པའི་ཇེ་གུ་སྤར་བར་བྲ། །

4.1.11 При чхиндри карпо (*mchin 'dri dkar po*) нужно вскрывать сосуд *mchin mkhris 'dom rtsa*, назначать холодный отвар *ba le ka* и *kyi lce*, готовить пасту-дегу *gur gum-8* {из *gur kum, li shi, sug smel, ka ko la, da byid, par pa ta, spang spos, shu mo za* на меду}.

མཆིན་རྩི་ནག་པོ་སྤག་ཁྱུན་ཐང་བཏང་ལ། །རུ་སྤང་གཏར་ཞིང་རྗེས་ལ་བརྒྱད་པ་བསྐྱེ། །

4.1.12 При чхиндри нагпо (*mchin 'dri nag po*) назначают отвар *brag zhun*, вскрывают сосуд *ru thung*, а затем прижигают восьмой позвонок.

གནད་མཆིན་ཅ་བྱེར་རུ་སྤང་ཅེ་རྒྱུད་གཏར། །འདྲེན་ཅ་ཨ་སོ་བྱིན་གཞུག་ལོང་ཅ་གཏར། །བ་ལེའི་ཐང་བཏང་འབྲས་བུ་གསུམ་
གྱིས་སྤང་། །

4.1.13 При [болезни] нечхин цаджер (*gnad mchin rtsa byer*) выпускают кровь из *ru thung, rtse chung, [mchin mkhris] 'dom rtsa, a so, byin gzhus, long rtsa*, дают отвар *ba le ka*, вычищают с помощью трёх плодов (*'bras bu gsum*).

དེ་ལྟར་མཆིན་ནད་ཚ་བ་དེ་ན་མས་ལ། །ཁ་བས་བསིལ་བཞེན་རུ་ལ་སྤྱར་བྱོད་བག་སྤང་། །ཚ་བ་ཚམས་ན་གསར་བརྒྱད་བྱོད་ལ་
དབབ། །རྗེས་ལ་ཚགས་པ་བརྒྱད་དགུ་གར་བབས་བསྐྱེ། །

4.1.14 При этих болезнях жара печени следует прибегать к охлаждающей пище, избегая даже слегка согревающего, испорченного, кислого. Когда жар спадёт, переходить на свежую, питательную и согревающую пищу, а потом прижигать восьмой и девятый позвонок — смотря куда попала болезнь.

མཆིན་རླུང་ཐོང་ཆོར་མཆིན་པ་ཐོད་བྲན་བཏང་། །འུར་དཀར་མར་གསར་ཏིང་ཁྲོལ་ཐོད་ལྷན་ཐུར། །ར་གསུམ་མར་སྦྱར་དགུ་
བ་ཁ་གསུམ་བསྟེན། །

4.2.1 При лунг печени (*mchin rlung*) дают печень двухлетнего барана со специями, назначают рассасывать тингтроль (*ting khrol*) на белом бурам (*bur dkar*) и сливочном масле со специями; готовят масло трёх «*ra*» (*ra gsum mar*), прижигают трёхустную точку девятого позвонка.

མཆིན་རླུང་དེ་འདྲ་སེ་འབྱུང་ལིས་བཏང་། །ཨ་རུ་འབྲི་རྒྱུ་གཟེ་མའི་སྦྱན་མར་སྦྱར། །

4.2.2 Так же [поступают] при чхингуд (*mchin rgud*); назначают составы из *se 'bru* и *da lis*, готовят лечебное масло из *a ru*, *'bri rkang* и *gze ma*.

མཆིན་ནང་རླན་གང་དེ་བཞིན་མཆིན་གསང་བསྟེན། །

4.2.3 При ленгранг (*rlan grang*) — «холодной и сырой» печени то же самое, прижигают точки печени.

མཆིན་པ་སྦང་དགུར་འབྲས་བྱའི་རྒྱན་བཤལ་བཏང་། །སེ་འབྱུང་ཕྱ་པ་སྒེམས་སྦྱན་སྦྱར་བ་བསྟེན། །ཁ་བས་ཁྲུ་རྩེས་ལ་མེ་ཡིས་
བཅད། །

4.2.4 При [болезни] печени ланг-гур (*glang dgur*) назначают слабительное длительного действия из [трёх] плодов, прибегают к *se 'bru*-5 с добавлением высушивающих лекарств, «пестроты» в питании, а затем пресекают прижиганием.

མཆིན་པ་གང་སྟོས་ད་ལིས་སེ་འབྱུང་སྦྱར། །ཕྱ་དང་རྒྱག་པ་ཕྱེན་སྒྲ་ཁ་གསུམ་བསྟེན། །

4.2.5 При [болезни] печени дрангбё (*grang sbos*) готовят составы из *da lis* и *se 'bru*; прижигают трехустные точки пятого, шестого позвонков и *lhen sna*.

དེ་ལྟར་མཆིན་ནད་གང་བ་བྱོད་ཀྱིས་བཅོས། །གསར་འཇམ་ལྷག་ཤ་ལ་སོགས་བྱོད་ལ་བསྒོར། །ཞིས་གསུངས་སོ།།

4.2.6 Такие болезни холода печени лечатся теплом, свежей мягкой бараниной и подобным — согревающим и питательным». Так сказано.

བདུད་ཅི་སྟོང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས་མཆིན་ནད་གསོ་བའི་ལེའུ་སྟེ་སོ་བྱུག་པའོ། །

Это тридцать шестая глава «Лечение болезней печени» из «Сущности амриты — восьмичленной тантры тайных наставлений».

перевод с тибетского на русский: Анастасия Теплякова