

ལེན་པ་རྒྱུ་ལ། ཚད་པའི་འཁྲུ་བ་གསོ་བ།

ГЛАВА 56 ЛЕЧЕНИЕ ПОНОСА ЖАРА

དེ་ནས་ཡང་དྲང་སྤང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསུངས་སོ། །ཀྱེ་དྲང་སྤང་ཆེན་པོ་ཉན་ཅིག།

Затем снова мудрец-риши Ригпей Еше (*rig pa'i ye shes*) молвил: «О, великий мудрец-риши, слушай же!

ཁྱེ་ནད་ཚད་འཁྲུ་སྐྱེ་བྱེད་བ་དང་། ཏྲགས་དང་བཙས་ཐབས་ནམ་པ་བཞི་ཡིས་བསྟན།

Тропическая болезнь понос жара (*tshad 'khrū*) объясняется в четырёх темах: причины и условия, классификация, симптомы и методы лечения.

སྐྱེ་བྱེད་མེ་དྲོད་མེ་སྟོམས་ཚུང་བ་ལ། རྩོད་ཆངས་ཆེ་བའི་ཡུལ་སར་ཚུ་མང་འབྱུངས། ཟས་ཚད་མ་ཟེན་གྲིང་གིང་ཐོག་འབྲ། བཅུད་མེད་ཟས་ཀྱིས་མེ་དྲོད་ཕྱིར་ལ་བཏོན། བྱི་ཡུལ་དྲོད་ཆངས་ཆེ་བས་མཆིན་ཚད་སྐྱེས། ལུས་ཀྱི་ཚུ་ཁམས་ཐུར་བསྐྱོད་འཁྲུ་བར་འབྱུང།

1 Причины и условия. Когда тот, у кого огненное тепло слабое и неровное, оказавшись в жаркой и очень влажной местности, пьёт много воды, не соблюдает меру питания, ест непитательные продукты такие как тощее мясо, фрукты и зёрна, то огненное тепло сдвигается наружу, внешние жара и влажность порождают жар печени, а жидкости тела устремляются вниз и оборачиваются поносом.

དེ་ཕྱི་བ་རྒྱུ་མཁྲིས་ཁྲག་དང་བད་ཀན་བཞི།

2 Классификация. Существует четыре [разновидности] от лунг, от трипа, от крови и от бекен.

དེ་ཉིད་མཁྲིས་ཁྲག་ཅིབ་ལྷགས་བཤང་ལམ་རྒྱལ། ལྷས་སྟོམ་ཁོང་པ་སྟོ་ཞིང་ཟས་མི་འཇུ། མ་སྟོན་རྒྱུ་འབྱམ་སྟོན་པ་དེ་ལས་ཚྭ།

3.1 Их симптомы: боли в области сердца, подреберье и в анусе, слабость в теле, вздутие живота, пища не переваривается. [Пока болезни] не созрела, понос водянистый, а созрев, наоборот.

རྒྱུ་གྱུར་སྒྱ་བ་སྒྲ་བཅས་བྱར་ཁུ་འདྲ། རྒྱར་འཁྲུ་སྐབས་སུ་འགག་ཅིང་གོང་བྱར་འབྱུང་། གཟེར་ཞིང་ཁ་སྐམ་བ་སྒྱ་ལྔ་བ་ཡིན། མཁྲིས་གྱུར་སེར་ནག་སྟོ་ལ་དྲི་མ་ཆེ། བཤང་ཁ་ཚ་ཞིང་ལྷས་རྩལ་སྟོམ་དད་ཆེ། ཁྲག་གྱུར་ཁྲག་ཏུ་འཁྲུ་ཞིང་གཞང་ཁ་འདྲལ། བད་གྱུར་སྐམ་འབྱུར་གཉིད་ཆེ་ཡི་ག་འཇུ།

3.2 В случае лунг звучно [извергаются] пенистые массы, похожие на сок сахарного тростника, то слабит водой, то каловые массы задерживаются, в них появляются комочки; возникают боли, сухость во рту, «гусиная» кожа. В случае трипа [каловые массы] горчично-зелёные, с сильным запахом, жжение в анусе, потливость, сильная жажда. В случае крови — понос с кровью, изъязвления в области ануса. В случае бекен — [массы] сухие и липкие, сильная сонливость, отвращение к пище.

བཅོས་ཐབས་མ་སྟོན་དང་པོའི་དུས་ཉིད་དུ། རང་རྒྱུ་ཚུ་ཚན་བཏང་ཞིང་རྒྱུང་བར་བྱ། ཁེ་འབྲུ་བེལ་བ་ད་ཉིག་བྱར་པ་སྒྲ། ལྷ་སུའི་ཐང་གིས་སྟོན་བྱེད་འཁྲུ་བ་གཙོད། བཤང་འབྱིངས་བྱེ་ཏང་ག་དང་འབྲས་བྱ་གསུམ། བི་པི་ལིང་བསྐོལ་ཁྲས་བཏང་ནི་རུས་དང་། འབྲས་སམ་བྱེ་བྱག་སྒྲ་སྟོན་བཅན་པ་དང་། ལྷག་དང་བ་ལང་སྐམ་སའི་ཤ་གསར་དང་། དར་གསར་ཆང་གསར་བསྐོལ་གང་མེ་དྲོད་བྱུར། ཟས་སྟོན་བསེལ་དྲོད་མཉམ་ཞིང་ཟས་ཚད་བཟུང་། སྒྲ་སྒྲང་བོང་ད་དཀར་པོ་བེལ་བ་སྒྲ། ཤིང་ཀྱན་དུག་མོ་ཉུང་ཁུ་བསྐྱས་འཇམ་བཏང་། བེལ་བ་ལྷ་སྒྲ་སྒྲང་བ་ལེ་ཀ། དོང་ག་བསྐོལ་གང་ཁུ་བ་སྒྲུད་པར་བྱ། འཁྲུ་བ་མ་སྟོན་མི་བཅད་ཉེས་པ་ཆེ། སྟོབས་རྒྱུང་ཟས་སྟོན་གཟབ་ཅིང་བཏང་སྟོམས་བཞག།

4.1 Методы лечения. В начале, пока [болезнь] ещё не созрела, нужно по утрам и вечерам пить кипяток, следует поголодать. Отвар из *se 'bru, bil ba, da trig, zur pa, sga* и *'u su* доводит [болезнь] до созревания и останавливает понос. Если кал застревает дают слабительное из вскипячённого отвара *byi tang ka, 'bras bu gsum* (три плода) и *pi pi ling* и выводят клизмой нируха. В соответствии с состоянием огненной теплоты прибегают к каше из риса или муки со специями, такими как *sga*, свежей баранине, говядине, [мясу животных] из сухих мест, свежему дару или чангу, охлаждённому кипятку. В питании и образе жизни охлаждающего и согревающего должно быть поровну, питание должно быть в меру. Следует давать смягчающий сгущённый отвар *gla sgang, bong nga dkar po, bil ba, sga, shing kun, dug mo nyung* или охлаждённый отвар *bil ba, 'u su, ba le ka, dong ga*. Незрелый понос нельзя останавливать — это очень вредно. При малой силе [болезни] нужно, соблюдая осторожность в питании и образе жизни, выравнивать [состояние больного].

ཐུང་ཐུང་བིལ་བ་སྒྲ་དང་བི་ཕི་ལིང་། ཁུ་རམ་ཏིལ་མར་སྒྲར་བཏང་འོ་ཐོན་ཐུང་། མཐིམ་ཐུང་དུག་མོ་ཉུང་དང་བོང་ང་
དཀར། འབྲས་ཁུ་སྒྲ་དང་སྒྲར་ལ་ཐུང་པར་བྲ། བོང་ང་དུག་མོ་ཉུང་དང་བ་ལེ་ཀ། བིལ་བ་སྒྲ་སྒྲ་འབྲས་ཁུ་སྒྲ་སྒྲར་
ཐུང་། ཁུག་ཐུང་ཏིལ་ནག་ཀ་ར་རའི་འོ་མ། ཡང་ན་ཅན་དན་འབྲས་ཁུ་སྒྲ་སྒྲར་བཏང་། ཏྲོང་ལེན་སྒྲེར་ཤུན་གྱི་སྒྲེགས་བི་ཕི་
ལིང་། སྒྲན་མར་འབྲས་ཀྱི་ཐུག་བ་སྒྲར་ལ་བཏང་། བད་ཀན་ལས་ཐུང་བིལ་བ་ཨ་རུ་ར། སྒྲ་དང་སྒྲ་སྒྲ་བསྐྱེལ་བའི་ཁུ་བ་
ཐུང་། བ་ཏྲ་སྒྲ་སྒྲ་བིལ་བ་མོན་ཆ་ར། སྒྲ་དང་ཁུ་ཐུ་བུ་རམ་དར་བཅས་བྱིན། བཅོས་རྗེས་གཅིན་མང་བཤང་བ་ཉུང་ལ་
སྒྲ། བྱེན་གྱི་སྒྲ་ཐོན་ཟས་འབྲུ་ནད་བྱང་ཏྲགས། ཟས་དང་སྒྲོད་ལམ་གཟབ་པས་འཚོ་བར་འགྱུར། ཁྲིས་གསུངས་སོ།

4.2 В случае лунг назначают *bil ba, sga, pi pi ling* с бурам и кунжутным маслом, поить тёплым молоком. В случае трипа — следует поить рисовым отваром с *dug mo nyung, bong nga dkar* и мёдом или рисовым отваром с *bong nga dkar, dug mo nyung, ba le ka, bil ba, gla sgang* и мёдом. В случае крови дают черный кунжут с сахаром и козьим молоком или *tsan dan* с рисовым отваром и мёдом, а также рисовую кашу, заправленную лечебным маслом из *hong len, skyer shun, rgya skyegs* и *pi pi ling*. В случае бекен — поить отваром *bil ba, a ru ra, sga* и *gla sgang*; давать состав из *pa tra, gla sgang, bil ba, mon cha ra, sga, 'u su* и бурам вместе с даром. После такого лечения мочи становится больше, а кала — меньше и он густеет. Когда появляются звуки отхождения газов, пища начинает

перевариваться — это признаки утихания болезни. Соблюдайте осторожность в питании и образе жизни — и [больной] поправится.» Так сказано.

བདུན་ཅི་སྟོང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས་ཚད་པའི་འབྲུ་བ་གསོ་བའི་ལཱ་སྟེ་ལྷ་བཙུ་ཙ་བླ་མ་
པའོ།།

Это пятьдесят шестая глава «Лечение поноса жара (*tshad pa'i 'khrū ba*)» из «Сущности амриты — восьмичленной тантры тайных наставлений».

перевод с тибетского на русский: Анастасия Теплякова